

Защитите себя от инфекций, передающихся иксодовыми клещами

Укус клеща - это реальная опасность попадания в организм клещевых инфекций!

Как защитить себя от клещевых инфекций?

Лучший способ *неспецифической профилактики* - предотвращение самого присасывания клеща. Если вы отправились в лес - выбирайте одежду, максимально закрывающую поверхность тела, однотонную светлого цвета – на ней клеща будет проще заметить. Желательно надеть рубашку или куртку с застегивающимся воротником и манжетами, заправить рубашку в брюки, а брюки в сапоги.

Проводите самоосмотр, либо осматривайте друг друга каждые 10-15 минут во время пребывания на природе. При проведении осмотра необходимо обращать внимание на «любимые» места присасывания клещей – в паховой и подмышечной областях, под грудью, за ушными раковинами, на голове.

Также рекомендуется использовать специальные химические средства – репелленты (отпугивающие клещей) для обработки одежды или акарицидные средства (убивающие клещей).

Осматривать собак и других животных после прогулок, для удаления с них прицепившихся и присосавшихся клещей. Ни в коем случае не раздавливайте клещей, т.к. при этом возбудитель заболевания может попасть в кровь через незаметную царапину на коже.

Как правильно вытащить (удалить) клеща из кожи человека

Если клещ все-таки присосался, в первую очередь, необходимо обратиться в лечебное учреждение для его извлечения. Чем быстрее будет удален клещ, тем меньше вероятность того, что в кровь попадет возбудитель опасного заболевания.

Что делать с клещом?

1. Клеща нужно сохранить в максимально неповрежденном состоянии, лучше живым. Поместите клеща в герметичную емкость с кусочком влажной ваты или свежей травинки.
2. Храните клеща до исследования, поместив в холодильник при температуре +4-8°C
3. Доставьте клеща в лабораторию в кратчайшие сроки для определения его инфицированности (г. Оренбург, ул. 60 Лет Октября, 2/1, одноэтажное здание во дворе, тел. 8(3532) 43-07-49 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»).

В случае получения результата «обнаружено»

С результатами анализа необходимо обратиться к врачу-инфекционисту в инфекционных стационарах или отделениях, либо в поликлинику. Вам будет назначена соответствующая профилактика развития заболевания.

Если Вам не удалось сдать клещей для анализа или при отрицательных результатах анализа в течение месяца после присасывания Вы почувствовали недомогание, повышение температуры тела, увеличивающееся красное пятно на месте присасывания, то необходимо обратиться к врачу, сообщив ему о факте присасывания клещей.



Факт!

На территории Оренбургской области природные очаги этого заболевания зарегистрированы в 9 городах и 27 районах. Наиболее активными очагами являются территории Илекского, Ташлинского, Новосергиевского, Бугурусланского, Северного, Бузулукского, Кувадынского, Тюльганского районов.



Мышиная лихорадка

Что это?

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) или народное название «мышинная лихорадка» - тяжелое, смертельно опасное инфекционное заболевание с поражением мелких кровеносных сосудов, почек, легких и других органов.

От кого можно заразиться?

Источником заражения людей вирусом ГЛПС являются мышевидные грызуны - хронические носители вируса. Во внешнюю среду вирус попадает со слюной, мочой, кровью, испражнениями грызунов. Основными хозяевами вируса в природе на территории области являются: рыжая и обыкновенная полевки, лесная, полевая, желтогорлая, домовая мышь.




Чем опасна болезнь!

Инфекция у человека протекает как лихорадочное заболевание, в котором ведущим является всеобщее поражение кровеносных сосудов и почек, выраженное в различной степени, с возможным смертельным исходом.

От человека к человеку заболевание не передается, поэтому больной человек для окружающих не опасен.

Как распознать ГЛПС?

- Инкубационный период: 7-10 дней, максимум - 40 дней.
- Первые признаки заболевания схожи с симптомами простуды: головная, мышечная боль, повышение температуры, заложенность носа, сухой кашель, иногда - тошнота, рвота, ухудшение зрения.
- После 45 дней с наступления первых симптомов: боль в пояснице, животе, сыпь, икота, нарушение работы почек, внутренние кровотечения.
- Если вы заметили симптомы заболевания и они не проходят более двух недель, надо обратиться к врачу и сдать анализы.



Как защититься?

- проводить постоянную борьбу с грызунами в населенных пунктах, в частных подворьях, в местах возможного скопления грызунов всеми известными методами (мышеловками, капканами);
- продукты питания ни в коем случае не оставлять на земле и в других местах, доступных для грызунов, хранить только в грызунонепроницаемой упаковке или в подвешенном состоянии;
- продукты питания испорченные грызунами или со следами их жизнедеятельности не употреблять в пищу;
- при проведении работ, связанных с пылеобразованием (кормление скота сеном) обязательно пользоваться средствами защиты органов дыхания (респираторами, ватно-марлевыми повязками);
- при проведении работ в местах скопления грызунов пользоваться перчатками;
- во время работ не курить, не принимать пищу;
- после проведения работ в местах скопления грызунов, перед приемом пищи тщательно мыть руки с мылом.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Оренбургской области**
(Управление Роспотребнадзора по
Оренбургской области)

**Центральный территориальный
отдел**

Ленинская ул., д. 57, г. Оренбург, 460000

Тел., факс: (3532) 77-65-33

E-Mail: cto@56.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76135607, ОГРН 1055610009718

ИНН/КПП 5610086110/561001001

15.04.2022 № 1213
На № _____ от _____

Главам администраций
муниципальных образований
(согласно списка)

О размещении информации на
сайте МО

Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области направляет для размещения на сайте муниципального образования информацию «Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС, мышьяная лихорадка) – опасная инфекция!», «Защитите себя от инфекций, передающихся иксодовыми клещами».

В соответствии с соглашением «О размещении информационных материалов» п. 1.2, информацию разместить в разделе сайта «Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области».

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Начальник отдела

О.Б. Каневская

Антонова Мария Сергеевна,
(3532) 774134

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС, мышинная лихорадка) – опасная инфекция!

Как происходит заражение? Вирус-возбудитель ГЛПС, может проникать в организм человека от инфицированных грызунов различными путями. Заражения людей наиболее часто происходят:

- при вдыхании инфицированной пыли во время уборки подвалов, погребов, садовых домиков, расположенных в лесу или вблизи леса;
- при сборе хвороста, валежника, ягод, грибов;
- при ночевках в стогах сена, скирдах соломы, вагончиках и других нежилых постройках;
- при употреблении пищевых продуктов, загрязненных грызунами (со следами погрызов, экскрементов грызунов);
- контактные заражения при отлове грызунов;
- несоблюдении правил личной гигиены в период пребывания в лесу.

Как проявляется заболевание? От момента заражения до появления первых признаков заболевания происходит от 4 до 30 дней. Заболевание начинается с повышения температуры (39-40 С). Отмечаются мучительные головные и мышечные боли, боли в глазах, иногда ухудшение зрения, появляются жажда и сухость во рту. На коже плечевого пояса и в подмышечных впадинах может появляться геморрагическая сыпь в виде одиночных или мелких множественных кровоизлияний. Особенно типичен для ГЛПС почечный синдром: резкие боли в животе и пояснице, резко уменьшается количество выделяемой мочи, в ней может появиться кровь.

Как себя защитить? В целях предупреждения заражения ГЛПС необходимо соблюдать меры предосторожности!

- уничтожать грызунов в домашних постройках, сараях, гаражах;
- избегать ночевки в стогах сена, скирдах соломы, шалашах, в заброшенных строениях;
- не использовать для подстилок прошлогоднее сено или солому;
- хранить продукты в хорошо закрываемой таре, недоступной для грызунов;
- не употреблять в пищу продукты, испорченные грызунами;
- при сборе хвороста, заготовке дров, других работах, связанных с возгонкой пыли, пользоваться перчатками и увлажненной 4-х слойной марлевой повязкой;
- соблюдать правила личной гигиены (мыть руки перед едой), не ловить и не брать в руки грызунов или их трупы.
- проводить очистку населенных мест от мусора, валежника, сухостоя, являющихся местами массового скопления и размножения грызунов с использованием средств защиты органов дыхания.

При появлении первых признаков заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

Центральный территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АКБУЛАКСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

Ул. Комсомольская, д. 15, п. Акбулак,
Оренбургская обл., 461551,
тел. факс 8 (35335) 2-15-75, 8 (35335) 2-11-40,
эл. почта: ak@mail.orb.ru

Главам сель (пос) советам

22.04.2022 № 05-11-83.

На № _____ от _____

Уважаемые коллеги!

Прошу Вас разместить информацию центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области о «Геморрагической лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС, мышьяная лихорадка) - опасная инфекция!», «Защитите себя от инфекций, передающихся иксодовыми клещами». В соответствии с соглашением «О размещении информационных материалов» п. 1.2, информацию разместить в разделе сайта «Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области».

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Заместитель главы администрации-
начальник управления сельского хозяйства

С.В. Вязовик